

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA
UFG/2015**

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas preliminares da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de **MÉDICO-ÁREA: SOCORRISTA**. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os diferentes níveis de acerto, quando for o caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

Questão 01

- a) Os possíveis diagnósticos são: HAS, IAM, PCR.
- b) A conduta inicial que o médico deverá tomar após fazer a avaliação inicial é administrar oxigênio, ABC da RCP, intubar após oferta de O₂, expansão volêmica.
- c) O médico, caso esse paciente evolua com ausência de pulso, deverá iniciar RCP, usar DEA, desfibrilar, se necessário.

(20 pontos)

Questão 02

- a) A conduta inicial na abordagem do quadro clínico descrito será melhorar oferta de O₂, e preparar material para intubação. As hipóteses diagnósticas para o caso são pneumonia, insuficiência respiratória e sepse.
- b) Os exames solicitados na abordagem inicial deverão ser os de rotina: hemograma, hemoculturas, eletrólitos, lactato, gasometria arterial e venosa central.
- c) O médico deverá proceder solicitando ajuda, tentando colocar ML ou tubo laríngeo e realizar cricotireoidostomia.

(20 pontos)

Questão 03

- a) Os cuidados médicos na abordagem nas primeiras três horas de atendimento ao paciente com sepse será colher lactato e hemoculturas, iniciar ATB, reposição volêmica.
- b) A monitorização nas primeiras seis horas de atendimento tem como objetivos terapêuticos desejados para esse período: monitorar PAM, PVC, diurese, ECG, SaO₂. Objetivos: PAM > 70mmHg, SVcO₂ > 70%, diurese presente, melhora da perfusão periférica.
- c) Os índices utilizados para avaliar a gravidade e o prognóstico desses pacientes serão: APACHE II, SAPS3, SOFA.

(20 pontos)