

**PROVA PRÁTICA – OSCE/2016**  
**PRÉ - REQUISITO - CLÍNICA MÉDICA**

**ESTAÇÃO E**

ETIQUETA

**CHECKLIST**

Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Identificou a Asma Brônquica como principal hipótese diagnóstica. Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
02	Classificou a doença como asma persistente leve. Sim (persistente <u>E</u> leve) = 1,0 Sim (apenas persistente <u>OU</u> apenas leve) = 0,5 Não classificou = 0,0			
03	Solicitou a Espirometria como exame complementar confirmatório da doença. Sim = 1,0 Não = 0,0		X	
04	Orientou sobre os fatores desencadeantes de exposição à poeira e poluição ambiental. Sim (os 2) = 1,0 Sim (apenas 1) = 0,5 Não orientou = 0,0			
05	Orientou sobre os fatores desencadeantes de exposição ao mofo e à fumaça. Sim (os 2) = 1,0 Sim (apenas 1) = 0,5 Não orientou = 0,0			
06	Orientou sobre os fatores desencadeantes de exposição a animais com pelo e ácaros e/ou baratas. Sim (os 2) = 1,0 Sim (apenas 1) = 0,5 Não orientou = 0,0			
07	a) Orientou sobre o tratamento com Budesonida, 200 ou 400 mcg, 1 cápsula, duas vezes ao dia. Sim (orientação completa) = 0,5 Orientação incompleta <u>OU</u> não orientou = 0,0 b) Orientou sobre o tratamento com Salbutamol spray, 100 mcg, 2 jatos, 4/4 h ou 6/6h, se apresentar sintomas. Sim (orientação completa) = 0,5 Orientação incompleta <u>OU</u> não orientou = 0,0			

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS**  
**FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS**  
**COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

<b>08</b>	<p>Orientou o uso adequado do dispositivo de Budesonida (retirar a tampa do dispositivo + colocar a cápsula + perfurar a cápsula + expirar + colocar o dispositivo na boca + inspirar a medicação + pausa inspiratória de 10 segundos + lavagem da boca). Sim (orientação completa) = 1,0 Sim (orientação incompleta) = 0,5 Não orientou = 0,0</p>			
<b>09</b>	<p>Orientou o uso adequado do dispositivo de Salbutamol (Retirar a tampa + agitar o dispositivo + posicionar, verticalmente, na boca OU até 5 cm da boca OU com o espaçador acoplado + expirar + acionar o dispositivo + inalar a medicação + pausa inspiratória de 10 segundos + repetição da técnica para o segundo jato). Sim (orientação completa) = 1,0 Sim (orientação incompleta) = 0,5 Não orientou = 0,0</p>			
<b>10</b>	<p>Orientou sobre as medidas de controle ambiental (evitar contato com poeira, plumas, mofo, fumaça, animais com pelos e insetos). Sim = 1,0 Não = 0,0</p>		<b>X</b>	

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Nome do Avaliador: \_\_\_\_\_